

# カドサイラ療法 を受けられる患者様へ

## カドサイラ療法について

トラスツズマブ エムタンシン（商品名;カドサイラ）とは、トラスツズマブとエムタンシンの複合体であり、トラスツズマブはがん細胞の表面にあるたんぱく質に結合してがん細胞の増殖を抑えます。エムタンシンはがん細胞に直接作用し、がん細胞の増殖を抑えます。

## 投与スケジュール 今日（ / ）は サイクル 日目

1日目にトラスツズマブ エムタンシンを投与します。後の20日間を休みとし、21日間を一区切り(1コース)とします。

トラスツズマブ  
エムタンシン  
投与  
1日目

休薬  
20日間

トラスツズマブ  
エムタンシン  
投与  
1日目

休薬  
20日間

1コース目

2コース目

ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

デキサメタゾン

吐き気を予防します。  
30分かけて投与します。

トラスツズマブ エムタンシン  
( mg)

初回は90分、2回目以降は  
30分かけて投与します。

生理食塩液


お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。

## 副作用について

自覚できる副作用

**アレルギー反応** 熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

**遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感** 気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。痛みがひどい場合、痛み止めを使うことができます。遠慮せずに申し出てください。



自覚できない副作用

**心機能障害** 心臓に負担をかける作用があります。発現時期は定まっていません。必要に応じて心臓の検査をしますので、点滴中に限らず、いつもと違うことや気になることがあった場合は、遠慮なく申し出てください。

**肝障害 腎障害**

**白血球減少  
血小板減少** 感染予防のため、手洗いうがいをしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。