

催吐リスク Moderate

肺 (PEM500+CBDCA5-6+BEV15)d1/c21d

薬剤名	投与経路	投与量	希釈液	点滴時間 (分)	投与日(day)
パロノセトロン	注射	0.75	mg		1
デキサメタゾン	注射	6.6	mg 生食	100 mL 30	1
アリムタ		500	mg/m2 生食	100 mL 10	1
カルボプラチン		6	AUC 5%糖液	250 mL 60	1
アバスチン		15	mg/kg 生食	100 mL 30	1
				mL	
				mL	

内服薬

デキサメタゾン 8mg 分2 朝昼食後 day2,3

投与基準等

Ⅱ. 投与基準 (例:白血球 $\geq 2000/mm^3$ 、好中球 $\geq 1000/mm^3$)

3000

1500

- ・白血球 $2000/mm^3$ 以上 かつ 好中球 $1000/mm^3$ 以上
- ・Plt 100000 以上
- ・PS 0 or 1
- ・ $37.5^\circ C$ 以上の発熱が無い事

Ⅲ. 減量基準 (例:Grade3 以上の好中球減少時、次回より投与量を80%に減量)

Grade3以上の好中球減少時、ペトレキセド・カルボプラチンは前回投与の 75%に減量
ペバシズマブは減量規定なし

Ⅳ. 重大な副作用 (例:好中球減少 Grade3 以上37. 5%)

- ・好中球減少
- ・骨髄抑制
- ・間質性肺炎など

ペバシズマブ特有の副作用

- ・喀血
- ・腫瘍出血
- ・血栓塞栓症 など

添付参考資料(文献・ガイドライン・治験計画書・研究計画書)
