

催吐リスク Low

肺(PEM500+BEV15)d1/c21d

薬剤名	投与経路	投与量	希釈液	点滴時間 (分)	投与日(day)
デキサメタゾン	注射	6.6	mg 生食	100 mL 30	1
アリムタ		500	mg/m <sup>2</sup> 生食	100 mL 10	1
アバスチン		15	mg/kg 生食	100 mL 30	1
				mL	
				mL	
				mL	

内服薬

投与基準等

II. 投与基準 (例:白血球  $\geq 2000/\text{mm}^3$ 、好中球  $\geq 1000/\text{mm}^3$ )

- ・白血球  $2000/\text{mm}^3$  以上 かつ 好中球  $1000/\text{mm}^3$  以上
- ・Plt 100000 以上
- ・PS 0 or 1
- ・ $37.5^\circ\text{C}$ 以上の発熱が無い事

Ⅲ. 減量基準 (例: Grade3 以上の好中球減少時、次回より投与量を80%に減量)

Grade3以上の好中球減少時、ペトレキセドは前回投与の 75%に減量  
ペバシズマブは減量規定なし

Ⅳ. 重大な副作用 (例: 好中球減少 Grade3 以上37.5%)

- ・好中球減少
- ・骨髄抑制
- ・間質性肺炎など

ペバシズマブ特有の副作用

- ・喀血
- ・腫瘍出血
- ・血栓塞栓症 など