


ノギテカン療法を 受けられる患者様へ

ノギテカン療法について

ノギテカン（商品名;ハイカムチン）とは、
がん細胞の分裂を阻害して腫瘍の増殖を抑える抗がん剤です。

投与スケジュール 今日（ / ）は サイクル 日目

1~5日目にノギテカンを投与します。
後の16日間を休みとし、21日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、
患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

点滴で投与する薬について

デキサメタゾン

吐き気止めのお薬です。
30分かけて投与します。

ノギテカン (mg)

抗がん剤です。
30分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。
5分かけて投与します。

副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応
急性嘔吐


熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐
食欲不振
便秘 倦怠感

気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。



自覚できない副作用

肝障害 腎障害

白血球減少
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

