


# ドセタキセル+カルボプラチン療法を受けられる患者様へ


## ドセタキセル+カルボプラチン療法について

この療法は、ドセタキセル(D)とカルボプラチン(C)という違う作用の抗がん剤を組み合わせる治療です。



## 投与スケジュール 今日 ( / ) は サイクル 日目

1日目に2種類の抗がん剤を投与します。  
後の20日間を休みとし、21日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

デキサメタゾン  
パロノセトロン

吐き気、浮腫を予防する薬です。  
30分かけて投与します。

ドセタキセル (    mg)

抗がん剤です。  
60分かけて投与します。

カルボプラチン (    mg)

抗がん剤です。  
60分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。  
5分かけて投与します。



お薬を続けていくと爪がでこぼこになったり、もろくなります。  
冷やすことで予防できますので、抗がん剤投与前からフローズングローブ・ソックスを着用します。

## 内服薬について

1日目	2日目	3日目	4日目

吐き気止め・浮腫予防のお薬です。症状が無くても服用してください。

## 副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛 浮腫  
味覚の変化  
末梢神経障害  
爪の変形

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。  
手足のしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状が現れたら、お伝えください。



肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗いうがいをしっかり行いましょう。  
38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

自覚できない副作用

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部  
川崎市中原区小杉町1-396 ☎(044)733-5181