

催吐リスク Moderate

腸 FOLFIRI/biweekly

薬剤名	投与経路	投与量	希釈液	点滴時間 (分)	投与日(day)
ブチルスコポラミン	注射	20	mg		1
パロノセトロン	注射	0.75	mg		1
デキサメタゾン	注射	6.6	mg 生食	100 mL 30	1
イリノテカン	150	mg/m ²	5%糖液	250 mL 90	1
レボホリナート	200	mg/m ²	5%糖液	250 mL 120	1
5-FU	400	mg/m ²	5%糖液	50 mL 全開	1
5-FU	2400	mg/m ²	生食	mL 46h	1-3
				mL	

内服薬

デキサメタゾン 8mg 分2 朝昼食後 day2,3

投与基準等

Ⅱ. 投与基準 (例:白血球 $\geq 2000/mm^3$ 、好中球 $\geq 1000/mm^3$)
好中球数 $\geq 1,500$ 、血小板数 $\geq 75,000$ 、下痢・口内炎 \leq Grade1

Ⅲ. 減量基準 (例: Grade3 以上の好中球減少時、次回より投与量を80%に減量)

ベバシズマブ(アバステン)

減量基準なし

FOLFIRI

好中球数<500、血小板<50,000、Grade3 以上の消化器系有害事象発現時、次回より投与量を80%に減量

Ⅳ. 重大な副作用 (例: 好中球減少 Grade3 以上37.5%)

高血圧	Grade3 以上	0.37%	(国内特定使用成績調査)
出血		1.37%	
蛋白尿		0.04%	
消化管穿孔		0.93%	
創傷治癒遅延		0.30%	
動脈血栓塞栓症		0.33%	
静脈血栓塞栓症		1.67%	

添付参考資料(文献・ガイドライン・治験計画書・研究計画書)