


# FOLFIRI療法を 受けられる患者様へ

## FOLFIRI療法について

この療法は、イリノテカンとフルオロウラシルという注射薬を  
組み合わせて行います。  
イリノテカンとフルオロウラシルはがん細胞に作用して、  
がん細胞の増殖を抑制します。

## 投与スケジュール 今日 ( / ) は サイクル 日目

1日目に2種類の抗がん剤を投与します。  
その内、フルオロウラシルは46時間かけて投与します。  
(3日目に針を抜きます)  
後の11日間を休みとし、14日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、  
患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

## 点滴で投与する薬について

デキサメタゾン  
パロノセトロン  
ブチルスコポラミン

吐き気止めのお薬です。  
30分かけて投与します。

イリノテカン (    mg)

抗がん剤です。  
90分かけて投与します。

レボホリナート

フルオロウラシルの効果を高めます。  
イリノテカンと同時に  
120分かけて投与します。

フルオロウラシル  
(    mg)

抗がん剤です。  
5分かけて投与します。

フルオロウラシル  
(    mg)

抗がん剤です。  
46時間かけて投与します。  
携帯用ポンプで持ち帰ります。

## 内服薬について

| 1日目 | 2日目   | 3日目   |
|-----|---|---|
|     |  |  |

吐き気予防のお薬です。吐き気が無くても服用してください。

## 副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応  
急性嘔吐 下痢

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐  
食欲不振  
便秘 倦怠感  
手足症候群


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢  
発疹

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛 色素沈着  
味覚の変化

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。



自覚できない副作用

肝障害 腎障害

白血球減少  
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。