

催吐リスク Moderate

腸 (CPT150/d1+s-1/d1-14)c21d

薬剤名	投与経路	投与量	希釈液	点滴時間 (分)	投与日(day)
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	経口		mg		1-14
			mg		
パロノセトロン	注射	0.75	mg		1
デキサメタゾン	注射	6.6	mg	生食 100 mL	30 1
イリノテカン	150	mg/m <sup>2</sup>	生食	500 mL	90 1
				mL	
				mL	
				mL	
				mL	

## 内服薬

デキサメタゾン 8mg 分2 朝昼食後 day2,3

## 投与基準等

Ⅱ. 投与基準 (例:白血球 $\geq 2000/\text{mm}^3$ 、好中球 $\geq 1000/\text{mm}^3$ )好中球数 $\geq 1,500/\text{mm}^3$ 、血小板数 $\geq 100,000/\text{mm}^3$ 、AST・ALT $\leq 100\text{U/L}$ (肝転移症例は $\leq 200\text{U/L}$ )、総ビリルビン $\leq 2.0\text{mg/dL}$ 、血清クレアチニン $\leq 1.2\text{mg/dL}$ 、下痢・口内炎・皮疹 $\leq \text{Grade}1$

### Ⅲ. 減量基準 (例: Grade3 以上の好中球減少時、次回より投与量を80%に減量)

#### ティーエスワン

好中球減少 $\geq$ Grade4、血小板 $\geq$ G3、AST・ALT $>$ 200U/L、血清クレアチニン $\geq$ 1.5mg/dL、下痢・口内炎 $\geq$ Grade3 時、次回より投与量を減量基準に従い減量する。(120 $\rightarrow$ 100 $\rightarrow$ 80 $\rightarrow$ 60 $\rightarrow$ 50(最低投与量)2段階、もしくは最低投与量を越える減量の場合は投与中止)

#### 塩酸イリノテカン

好中球減少 $\geq$ Grade4、血小板 $\geq$ G3、AST・ALT $>$ 200U/L、下痢 $\geq$ Grade3 時、次回より投与量を減量基準に従い減量する。(150 $\rightarrow$ 125 $\rightarrow$ 100(最低投与量))

### Ⅳ. 重大な副作用 (例:好中球減少 Grade3 以上37.5%)

G3 以上の副作用を記載 n=40

貧血 7.5%、好中球減少 15%、血小板減少 2.5%、下痢 7.5%、食欲不振 12.5%、悪心・嘔吐 2.5%、ビリルビン上昇 2.5%、AST・ALT 上昇 5%

添付参考資料(文献・ガイドライン・治験計画書・研究計画書)