

催吐リスク Moderate

腸 mFOLFOX6+BEV5・10/biweekly

薬剤名	投与経路	投与量	希釈液			点滴 時間 (分)	投与日(day)
			mg				
パロノセトロン	注射	0.75	mg				1
デキサメタゾン	注射	6.6	mg	生食	100 mL	30	1
アバスチン	5	mg/kg		生食	100 mL	10	1
エルプラット	85	mg/m ²		5%糖液	250 mL	120	1
レボホリナート	200	mg/m ²		5%糖液	250 mL	120	1
5-FU	400	mg/m ²		5%糖液	50 mL	全開	1
5-FU	2400	mg/m ²		生食	mL	46h	1-3

内服薬

デキサメタゾン 8mg 分2 朝昼食後 day2,3

投与基準等

Ⅱ. 投与基準 (例:白血球 $\geq 2000/\text{mm}^3$ 、好中球 $\geq 1000/\text{mm}^3$
好中球数 $\geq 1,500$ 、血小板数 $\geq 75,000$ 、下痢・口内炎 $\leq \text{Grade 1}$)

Ⅲ. 減量基準（例：Grade3 以上の好中球減少時、次回より投与量を80%に減量）

ペバシズマブ(アバスチン)

減量基準なし

mFOLFOX6

好中球数<500、血小板<50,000、Grade3 以上の消化器系有害事象発現時、次回より投与80%に減量

Ⅳ. 重大な副作用（例：好中球減少 Grade3 以上37.5%）

高血圧	Grade3 以上	0.37%	（国内特定使用成績調査）
出血		1.37%	
蛋白尿		0.04%	
消化管穿孔		0.93%	
創傷治癒遅延		0.30%	
動脈血栓塞栓症		0.33%	
静脈血栓塞栓症		1.67%	

添付参考資料（文献・ガイドライン・治験計画書・研究計画書）