

セツキシマブ + FOLFOX療法を受けられる患者様へ

セツキシマブ + FOLFOX療法について

この療法は、セツキシマブ（商品名：アービタックス）、オキサリプラチン（商品名：エルプラット）とフルオロウラシル（商品名：5-FU）という注射薬を組み合わせて行います。

セツキシマブ、オキサリプラチン、フルオロウラシルはがん細胞に作用して、がん細胞の増殖を抑制します。

投与スケジュール 今日(/)は サイクル 日目

1日目に3種類の抗がん剤を投与します。

その内、フルオロウラシルは46時間かけて投与します。

（3日目に針を抜きます）

後の11日間を休みとし、14日間を一区切り（1コース）とします。

抗がん剤
投与
1～3日目

休薬
11日間

抗がん剤
投与
1～3日目

休薬
11日間

1コース目

2コース目

ここに示したスケジュールは参考であり、
患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

点滴で投与する薬について

ポララミン

デキサメタゾン

パロノセトロン

セツキシマブ (mg)

オキサリプラチン (mg)

レボホリナート

フルオロウラシル (mg)

フルオロウラシル (mg)

吐き気止め、アレルギー予防のお薬です。30分かけて投与します。

抗がん剤です。初回2時間、2回目90分、3回目以降60分かけて投与します。

抗がん剤です。
120分かけて投与します。

フルオロウラシルの効果を高めます。
オキサリプラチンと同時に
120分かけて投与します。

抗がん剤です。
5分かけて投与します。

抗がん剤です。
46時間かけて投与します。
携帯用ポンプで持ち帰ります。

内服薬について

1日目	2日目	3日目
		

吐き気予防のお薬です。吐き気が無くても服用してください。

副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、
すぐにお伝えください。


遅発性嘔吐
食欲不振
便秘 倦怠感
しびれ

気持ちが悪い時には我慢せずに
申し出てください。他にもお薬があります。
冷たいものに触れるときしびれが起きやすくな
ります。手足のしびれ、感覚が鈍くなる
などの症状が現れたら、お伝えください。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。
遠慮せずに申し出てください。

色素沈着
味覚の変化



肝障害 腎障害


白血球減少
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり
行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は
病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、
お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

セツキシマブの副作用について

自覚できない副作用



投与初期からきびのよなかゆみを伴う皮疹や乾燥が現れます。
保湿が一番の予防になりますので、処方されている保湿剤や塗り薬
を普段からこまめに使うようにしましょう。