


ラムシルマブ+FOLFIRI療法を 受けられる患者様へ

ラムシルマブ+FOLFIRI療法について

この療法は、ラムシルマブ(商品名;サイラムザ)、イリノテカン、フルオロウラシルという注射薬を組み合わせで行います。ラムシルマブはがん細胞に延びてくる血管を抑えて、がん細胞に栄養や酸素を与えないようにします。イリノテカンとフルオロウラシルはがん細胞に作用して、がん細胞の増殖を抑制します。

投与スケジュール 今日 (/) は サイクル 日目

1日目に3種類の抗がん剤を投与します。
その内、フルオロウラシルは46時間かけて投与します。
(3日目に針を抜きます)
後の11日間を休みとし、14日間を一区切り(1コース)とします。



ここに示したスケジュールは参考であり、患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

点滴で投与する薬について

デキサメタゾン
パロノセトロン
ポララミン

吐き気止め、アレルギー予防のお薬です。
30分かけて投与します。

ラムシルマブ (mg)

抗がん剤です。
60分かけて投与します。

ブチルスコポラミン

副作用予防のお薬です。
5分かけて投与します。

イリノテカン (mg)

抗がん剤です。
90分かけて投与します。

レボホリナート

フルオロウラシルの効果を高めます。120分かけて投与します。

フルオロウラシル (mg)

抗がん剤です。
5分かけて投与します。

フルオロウラシル (mg)

抗がん剤です。
46時間かけて投与します。

副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応
急性嘔吐 下痢

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐
食欲不振
便秘 倦怠感
手足症候群


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。

口内炎 下痢
発疹

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛 色素沈着
味覚の変化

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。



自覚できない副作用

肝障害 腎障害

白血球減少
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり行いましょう。38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

ラムシルマブの副作用について

治療の継続に伴い、**高血圧**、**タンパク尿**がみられることがあります。血圧を下げる薬を使用することがあります。重篤な副作用として、**出血**、**消化管穿孔**、**血栓塞栓症**などが報告されています。血が止まらない、通常と異なる激しい痛みが生じた場合には、直ぐに病院に連絡してください。

日本医科大学武蔵小杉病院薬剤部
川崎市中原区小杉町1-396 ☎(044)733-5181