

ラムシルマブ+パクリタキセル療法を 受けられる患者様へ

ラムシルマブ+パクリタキセル療法について

この療法は、ラムシルマブ(商品名:サイラムザ)とパクリタキセルという2種類の注射薬を使用します。ラムシルマブはがん細胞に伸びてくる血管を抑えて、がん細胞に栄養や酸素を与えないようにします。パクリタキセルはがん細胞に直接作用し、がん細胞の増殖を抑えます。

投与スケジュール 今日 (/) は サイクル 日目

1日目と15日目に2種類の抗がん剤を投与します。
8日目はパクリタキセルのみ投与します。
28日間を一区切り(1コース)とします。

抗がん剤 投与 1日目	休薬 6日間	抗がん剤 投与 8日目	休薬 6日間	抗がん剤 投与 15日目	休薬 13日間
-------------------	-----------	-------------------	-----------	--------------------	------------

1コース目

2コース目

ここに示したスケジュールは参考であり、
患者さんの状態や副作用によって変更することがあります。

点滴で投与する薬について

デキサメタゾン
クロルフェニラミン
ファモチジン

吐き気とアレルギーを予防します。
30分かけて投与します。

ラムシルマブ
(mg)

抗がん剤です。
60分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。
5分かけて投与します。

パクリタキセル
(mg)

抗がん剤です。
60分かけて投与します。

生理食塩液

お薬を洗い流します。
5分かけて投与します。

パクリタキセルについて

パクリタキセルはアルコール(ビールでコップ1杯程度)を含んでいますので、お酒を飲んだ時のような症状(顔がほてる、眠気等)が現れることがあります。
点滴をする日に車で来院することは控えてください。

副作用について

自覚できる副作用

アレルギー反応
急性嘔吐

熱感・かゆみ・動悸などの症状が現れたら、すぐにお伝えください。

遅発性嘔吐
食欲不振
便秘 倦怠感
筋肉痛・関節痛


気持ちが悪い時には我慢せずに申し出てください。他にもお薬があります。痛みがひどい場合、痛み止めを使うことができます。遠慮せずに申し出てください。

口内炎 下痢

口内炎・下痢・便秘にはお薬が有効です。遠慮せずに申し出てください。

脱毛
味覚の変化
末梢神経障害

髪の毛は、治療終了後半年くらいで再び生えてきます。
手足のしびれ、感覚が鈍くなるなどの症状が現れたら、お伝えください。



自覚できない副作用

肝障害 腎障害

白血球減少
血小板減少

感染予防のため、手洗いをこまめにしっかり行いましょう。
38℃以上の発熱がある場合は病院に連絡をして下さい。

その他にも気になる症状がありましたら、お気軽に医療スタッフまでご相談ください。

ラムシルマブの副作用について

治療の継続に伴い、**高血圧**、**タンパク尿**がみられることがあります。血圧を下げる薬を使用することがあります。
重篤な副作用として、**出血**、**消化管穿孔**、**血栓塞栓症**などが報告されています。血が止まらない、通常と異なる激しい痛みが生じた場合には、直ぐに病院に連絡してください。