

薬剤名	投与経路	投与量	希釈液	点滴時間(分)	投与日(day)
グラニセトロン	注射	1	mg		1
クロルフェニラミンマレイン酸塩	注射	5	mg		1
ファモチジン	注射	20	mg		1
デキサメタゾン	注射	9.9	mg 生食	100 mL 30	1
パクリタキセル	80	mg/m ²	5%糖液	250 mL 60	1
カルボプラチン	2	AUC	5%糖液	250 mL 60	1
				mL	
				mL	
				mL	

内服薬

投与基準等

Ⅱ. 投与基準 (例:白血球 $\geq 2000/\text{mm}^3$ 、好中球 $\geq 1000/\text{mm}^3$)

好中球 $> 1,500/\mu\text{l}$

血小板 $> 100,000/\mu\text{l}$.

血清クレアチニン $< 2 \times$ institutional upper limit normal (ULN)

ビリルビン $< 1.5 \times$ ULN

※次コース投与基準

好中球 $> 1,000/\mu\text{l}$

血小板 $> 75,000/\mu\text{l}$.

血清クレアチニン $< 2 \times$ institutional upper limit normal (ULN)

トランスアミナーゼ $< 100\text{IU/L}$

2週にわたり上記基準をクリアできないと中止

Ⅲ. 減量基準 (例:Grade3 以上の好中球減少時、次回より投与量を80%に減量)
記載なし

Ⅳ. 重大な副作用 (例:好中球減少 Grade3 以上37.5%)

好中球減少症 Grade 3 以上 58%

血小板減少症 grade 3 以上 0%

貧血 Grade 3 以上 35%

神経障害 Grade3 以上 0%

好中球減少性発熱症 Grade3 以上 9%

悪心嘔吐 Grade3 以上 3%

添付参考資料(文献・ガイドライン・治験計画書・研究計画書)

Eur Urol. 2007 Oct;52(4):1115-22