

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： NSC-126

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
非小細胞肺がん	PEM単剤	21日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他

催吐リスク
軽度

根拠
J Clin Oncol 22: 1589-97, 2004

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート 生理食塩液	13.2mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
②	アリムタ 生理食塩液	500mg/m ² 100mL	点滴静注	10分	↓																				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

<注意事項/備考>

- ✓ PEMの副作用軽減目的のために、葉酸とビタミンB12を併用
 - 葉酸：初回投与7日以上前から1日1回0.5mgを連日経口投与（PEM中止/終了の場合は、最終投与から22日目まで継続）
 - PEM：葉酸：ビタミンB12：初回投与少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与（投与期間中、投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与）
- ✓ PEM：頻度は低いが、間質性肺炎や急性肺障害の報告あり、症状発現時はX線検査などを検討
- ✓
- ✓