【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： CRC-109

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応
大腸がん	UFT/LV	35日間	【進行/再発】 規定なし 【術後補助】 6か月	■ 進行/再発 ■ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他

催吐リスク	根拠
軽度	J Clin Oncol 20: 3605-, 2002 J Clin Oncol 20: 3617-, 2002 J Clin Oncol 24: 2059-, 2006

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	～	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
①	UFT	300mg/㎡/日	内服	1日3回に分けて食間	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓							
②	ユーゼル	75mg/body/日	内服	1日3回に分けて食間	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓							

＜注意事項/備考＞

✓ UFT投与量：BSA＜1.17㎡：300mg/day、1.17≦BSA≦1.49㎡：400mg/day、1.50≦BSA≦1.83㎡：500mg/day、BSA＞1.83㎡：600mg/day

✓ 他のフッ化ピリミジン系薬剤と併用禁忌（前後7日間以上の間隔を空ける）

✓ 術後補助化学療法の場合：6ヶ月（5コース）が目安

✓ UFT：食事の前後1時間を避けて（空腹時）内服 → 食後投与によりウラシルおよびテガフールから変換されたフルオロウラシルのAUC減少のため

✓

✓