【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： OVA-104

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
卵巣がん	DC療法	21日間	6コース	■ 進行/再発 ■ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他	高/中	J Natl Cancer Inst 96: 1682-91, 2004

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート アロキシ 生理食塩液	6.6mg 0.75mg 50mL	点滴静注	15分	↓																				
③	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75mg/㎡ 250mL	点滴静注	60分	↓																				
④	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 5 250mL	点滴静注	60分	↓																				
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				

＜注意事項/備考＞

✓ TC療法のオプション、好中球減少症はTC療法より頻度↑
✓ DOC：浮腫予防として、DEX 8mg/dayを2日間内服（day1夕～day3朝）の検討も
✓ CBDCA：投与回数を重ねると、ショック、アナフィラキシー様症状の発現頻度が高くなる傾向（8コース前後）
✓
✓
✓