

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： PRST-111

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
前立腺がん	Cabazitaxel	21日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	Lancet 376: 1147-54, 2010

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	デキサート ポラミン ファミチジン 生理食塩液	6.6mg 5mg 20mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分	↓																				
③	ジェブタナ 生理食塩液	25mg/m <sup>2</sup> 250mL*	点滴静注	60分	↓																				
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
⑤	ジーラスタ	3.6	皮下注			↓																			

## <注意事項/備考>

- ✓ \*Cabazitaxelの希釈液量は投与量によって変更（最終濃度0.10-0.26mg/mL）  
投与量<25mg ⇒ 生食100mL、投与量25-65mg ⇒ 生食250mL、投与量>65mg ⇒ 生食500mL
- ✓ PSL 10mg/dayの内服を併用（省略する場合あり）
- ✓ FN：リスク大、ペグフィルグラスチムの投与が必要
- ✓ 添付溶解液1Vあたり、日局エタノール573.3mg含有（ビール換算約14.6mL）
- ✓ 0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与（希釈後の溶解液は過飽和状態）
- ✓ 添付溶解液に含まれるポリソルベート80によるアレルギーに注意