# 【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： TCC-101

| 対象疾患 | レジメン名称 | コース期間 | 総コース数 | 適応 | 催吐リスク | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尿路上皮がん | GC療法（q4w） | 28日間 | 規定なし | ■ 進行/再発<br>□ 術後補助化学療法<br>□ 術前補助化学療法<br>□ 放射線併用化学療法<br>□ その他 | 高 | J Clin Oncol 17: 3068-77, 2000<br>J Clin Oncol 23: 4602-8, 2005 |

| | 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | Day 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | デキサート<br>生理食塩液 | 6.6mg<br>50mL | 点滴静注 | 15分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| ② | ゲムシタビン<br>生理食塩液 | 1000mg/㎡<br>100mL | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| ③ | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 5分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | |
| ④ | デキサート<br>アロキシ<br>生理食塩液 | 9.9mg<br>0.75mg<br>50mL | 点滴静注 | 15分 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ | 硫酸Mg<br>フィジオ70 | 8mL<br>500mL | 点滴静注 | 60分 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ | マンニトール | 300mL | 点滴静注 | 60分 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦ | シスプラチン<br>生理食塩液 | 70mg/㎡<br>250mL | 点滴静注 | 60分 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧ | フィジオ70 | 500mL | 点滴静注 | 60分 | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

＜注意事項/備考＞

✓ 催吐リスク：高：NK1受容体拮抗薬+5HT3拮抗薬+DEX
✓ CDDP：腎毒性軽減目的にMg投与
✓ 聴力障害（CDDP）：総投与量300㎎/㎡以上で高音域の聴力低下、耳鳴りなどの発現↑
✓ GEM：血管痛、皮疹に注意
✓ GEM：30分かけて投与（６０分以上かけて投与すると副作用増強の可能性）
✓