【日本医科大学付属病院　がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： HNC-115

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
頭頸部がん	Pembrolizumab 単剤	21日間 or 42日間	規定なし（24ヶ月）	■ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他	最小度	Lancet 394: 1915-28, 2019

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	～	20	21
【3週間隔で投与する場合】									
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓				
②	キイトルーダ 生理食塩液	200mg/body 50mL	点滴静注	30分	↓				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓				

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day 1	2	～	41	42
【6週間隔で投与する場合】									
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓				
②	キイトルーダ 生理食塩液	400mg/body 50mL	点滴静注	30分	↓				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓				

＜注意事項/備考＞

- ✓ Pembrolizumab：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与
- ✓ 間質性肺炎：初期症状は息切れ、発熱、咳嗽（空咳）など。胸部X線検査やSPO2モニタリング等で定期的にモニタリングを
- ✓ 血糖上昇：口渇、多飲、多尿、倦怠感などの症状に注意。来院時には血糖の測定を
- ✓ 大腸炎、下痢：持続する腹痛、嘔吐、下痢、血便など
- ✓ 甲状腺機能障害：投与中は定期的にＴＳＨ、ＦＴ３、ＦＴ４などの検査を
- ✓