

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号：BTC-104

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
胆道がん	GS療法 (GEM+S-1)	21日間	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	軽度	Ann Oncol 30: 1950-58, 2019

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
①	グラニセトロン 生理食塩液	3mg 100mL	点滴静注	30分	↓								↓															
②	ゲムシタピン 生理食塩液	1000mg/m ² 100mL	点滴静注	30分	↓								↓															
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓								↓															
④	ティーエスワン	60mg/m ² /日	内服	1日2回に分けて 朝夕食後	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓						

<注意事項/備考>

- ✓ GEM：血管痛、皮疹に注意
- ✓ GEM：30分かけて投与（60分以上かけて投与すると副作用増強の可能性）
- ✓ S-1：投与量：BSA<1.25m²：60mg/day、1.25≤BSA≤1.5m²：80mg/day、BSA>1.5m²：100mg/day
- ✓ S-1：他のフッ化ピリミジン系薬剤と併用禁忌（前後7日間以上の間隔を空ける） / 空腹時の内服は避ける（抗腫瘍効果減弱の可能性）
- ✓
- ✓