

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

※無断転載禁止

レジメン番号： SCLC-115

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
小細胞肺がん	Atezolizumab + CBDCA/ETP	21日間	4+ αコース	<ul style="list-style-type: none"> ■ 進行/再発 □ 術後補助化学療法 □ 術前補助化学療法 □ 放射線併用化学療法 □ その他 	高	N Engl J Med 379: 2220-9, 2018



	薬品名	投与量	投与 経路	投与 時間	Day																					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																					
②	テセントリク 生理食塩液	1200mg/body 50mL	点滴静注	初回60分 2回目～ 30分	↓																					
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																					
④	デキサート パロノセトロン アロカリス	6.6mg 0.75mg/50mL 235mg	点滴静注	30分	↓																					
	デキサート 生理食塩液	6.6mg 50mL	点滴静注	15分		↓	↓																			
⑤	エトボシド 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 500mL	点滴静注	60分	↓	↓	↓																			
⑥	カルボプラチナ 5%ブドウ糖液	AUC 5 250mL	点滴静注	60分	↓																					
⑦	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓	↓	↓																			
上記4コース施行後、下記維持療法へ（病勢増悪まで）																										
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																					
②	テセントリク 生理食塩液	1200mg/body 50mL	点滴静注	30分	↓																					
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																					

<注意事項/備考>

- ✓ スケジュール：4コース施行後、PDや毒性による中止まで、Atezo単剤を継続
- ✓ Atezo：院内マニュアルに基づいて、治療開始前、投与中（定期的）、症状発現時の検査が必要

✓ ETP：調製時間に注意（調製後、長時間放置にて結晶析出）

:>



_