

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

«無断転載禁止»

レジメン番号：NHL-141(2サイクル目以降)

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
非ホジキン リンパ腫	Pola-BR療法	21日間	6コース	<input type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	Cancer Sci. 2021; 112(7): 2845-2854. (JO40762試験[P-DRIVE]試験)

	薬品名	投与量	投与 経路	投与 時間	Day																						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
①	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	医師指示	↓																						
②	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																						
③	ポライバー 生理食塩液	1.8mg/kg 50/100mL	点滴静注	30分	↓																						
※体重<45kgの場合は生理食塩液50mLに希釈																											
④	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																						
⑤	パロノセトロン	0.75mg	点滴静注	5分	↓																						
	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分		↓																					
⑥	ベンダムスチン 生理食塩液	90mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	60分	↓	↓																					
⑥	生理食塩液	250mL	点滴静注 (側管)	60分	↓	↓																					
⑦	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓	↓																					

＜注意事項/備考＞

- ✓ Infusion reaction予防としてリツキシマブ投与前にブルフェン200mg・ポララミン2mg内服(ソルコーテフ適宜使用可)
- ✓ 血管痛予防のためベンダムスチン投与時に側管より生理食塩液250mL同時投与
- ✓ ポライバー：初回90分、2回目以降30分で投与
- ✓ Grade2 - 3末梢性ニューロパシー→14日以内に≤Grade1に回復：ポライバー1.4mg/kgに減量し再開  
14日までに≤Grade1に回復しなかった場合：ポライバー投与中止
- ✓ 2024/04よりトリアキシンからベンダムスチンへ変更。