

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： NSC-122

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
小細胞肺がん	CDDP+S-1	28日間	3～6コース	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高	Clin Cancer Res 10: 7860-64, 2004 J Clin Oncol 28: 5240-6, 2010

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
①	デキサート パロノセトロン アロカリス	9.9mg 0.75mg/50mL 235mg	点滴静注	30分								↓																				
②	硫酸Mg フィジオ70	8mL 500mL	点滴静注	60分								↓																				
③	マンニトール	300mL	点滴静注	60分								↓																				
④	シスプラチン 生理食塩液	60mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	60分								↓																				
⑤	フィジオ70	500mL	点滴静注	60分								↓																				
⑥	ティーエスワン	80mg/m <sup>2</sup>	内服	1日2回 朝夕食後	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓	↓↓						

## <注意事項/備考>

- ✓ CDDP：腎毒性軽減目的にMg投与
- ✓ 催吐リスク：高：NK1受容体拮抗薬+5HT3拮抗薬+DEX
- ✓ S-1投与量：BSA<1.25m<sup>2</sup>：80mg/day、1.25≤BSA≤1.5m<sup>2</sup>：100mg/day、BSA>1.5m<sup>2</sup>：120mg/day
- ✓
- ✓



:>>


28


└─