

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無斷転載禁止》

レジメン番号： NSC-130

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非小細胞肺がん	CBDCA/PEM + Bv	21日間	4~6コース	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	J Clin Oncol 27: 3284-89, 2009 J Clin Oncol 31: 4349-57, 2013

### 〈注意事項/備考〉

- ✓ PEMの副作用軽減目的のために、葉酸とビタミンB12を併用  
　　葉酸：初回投与7日以上前から1日1回0.5mgを連日経口投与（PEM中止/終了の場合は、最終投与から22日目まで継続）  
　　PEM：葉酸：ビタミンB12：初回投与少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与（投与期間中、投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与）
  - ✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与
  - ✓
  - ✓

:»

