

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

※無断転載禁止

レジメン番号： NSC-169

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非小細胞肺がん	CDDP/PEM+Bv	21日間	4コース+α	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 進行/再発</li> <li>□ 術後補助化学療法</li> <li>□ 術前補助化学療法</li> <li>□ 放射線併用化学療法</li> <li>□ その他</li> </ul>	高	J Clin Oncol 31: 3004-11, 2013

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
①	アバスチン 生理食塩液	7.5mg/kg 100mL	点滴静注	初回 90分 2回目 60分 3回目～30分	↓																					
②	デキサート パロノセトロン アロカリス	9.9mg 0.75mg/50mL 235mg	点滴静注	30分	↓																					
③	アリムタ 生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	10分	↓																					
④	硫酸Mg フィジオ70	8mL 500mL	点滴静注	60分	↓																					
⑤	マンニトール	300mL	点滴静注	60分	↓																					
⑥	シスプラチニン 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	60分	↓																					
⑦	フィジオ70	500mL	点滴静注	60分	↓																					
	上記4コース施行後、維持療法 (PEM(day1)+Bv(day1) q3w) を病勢進行まで施行																									

## ＜注意事項/備考＞

- ✓ CDDP：腎毒性軽減目的にMg投与
- ✓ 催吐リスク：高：NK1受容体拮抗薬+5HT3拮抗薬+DEX
- ✓ PEMの副作用軽減目的のために、葉酸とビタミンB12を併用
  - 葉酸：初回投与7日以上前から1日1回0.5mgを連日経口投与（PEM中止/終了の場合は、最終投与から22日目まで継続）
  - ビタミンB12：初回投与少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与（投与期間中、投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与）

✓ Bv：初回90分、2回目60分、3回目以降30分かけて投与

---

:»

—