

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

※無断転載禁止

レジメン番号： NSC-176

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非小細胞 肺がん	Pembrolizumab +CBDCA/PTX	21日間	4コース+α	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	中	N Engl J Med 379: 2040-51, 2018



	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
②	キイトルーダ 生理食塩液	200mg/body 50mL	点滴静注	30分	↓																				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
⑤	パロノセトロン アロカリス	0.75mg/50mL 235mg	点滴静注	30分	↓																				
④	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩液	19.8mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分	↓																				
⑥	パクリタキセル 生理食塩液	200mg/m ² 500mL	点滴静注	180分	↓																				
⑦	カルボプラチナ 5%ブドウ糖液	AUC6 250mL	点滴静注	60分	↓																				
⑧	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
上記4コース施行後、維持療法 (Pembrolizumab単剤(day1) q3w) を病勢進行まで施行																									

<注意事項/備考>

- ✓ PTX : ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギー症状に注意
- ✓ PTX : 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与、DEHPを含まない輸液セット使用
- ✓ Pembrolizumab : 0.2または0.22 μmのインラインフィルターを用いて投与
- ✓
- ✓

✓

:»



_