

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

≪無断転載禁止≫

レジメン番号： NSC-177

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
非小細胞 肺がん	Pembrolizumab +CBDCA /nab-PTX	21日間	4コース+α	☒ 進行/再発 ☐ 術後補助化学療法 ☐ 術前補助化学療法 ☐ 放射線併用化学療法 ☐ その他	中	N Engl J Med 379: 2040-51, 2018

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
②	キイトルーダ 生理食塩液	200mg/body 50mL	点滴静注	30分	↓																				
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
④	生理食塩液	50mL	点滴(側管)	5分	↓							↓						↓							
⑤	アブラキサン 生理食塩液	100mg/m ² 適量	点滴(側管)	30分	↓							↓						↓							
⑥	生理食塩液	50mL	点滴(側管)	5分	↓							↓						↓							
⑦	デキサート パロノセトロン アロカリス	6.6mg 0.75mg/50mL 235mg	点滴静注	15分	↓																				
⑧	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 6 250mL	点滴静注	60分	↓																				
⑨	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																				
	上記4コース施行後、維持療法（Pembrolizumab単剤(day1）q3w）を病勢進行まで施行																								

<注意事項/備考>

- ✓ nab-PTX：特性生物由来製品→使用記録（氏名、住所、使用年月日、製造番号）を20年間保管
- ✓ nab-PTX：インラインフィルター使用禁
- ✓ Pembrolizumab：0.2または0.22μmのインラインフィルターを用いて投与
- ✓
- ✓



⋮➤



