

# 【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無断転載禁止》

レジメン番号： NSC-193

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐リスク	根拠
非小細胞 肺がん	Nivolumab+ Ipilimumab+ CDDP+PEM	下記参照	規定なし	<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高	ChecMate 9LA N Engl J Med.2019;381:2020-31

	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	Day																											
					1					8					15					22					29					36	43	
オブジーボは3週ごと、ヤーボイは6週ごとの投与を繰り返す																																
①	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓														↓												↓	
②	オブジーボ 生理食塩液	360mg/body 100mL	点滴静注	30分	↓														↓												↓	
③	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓																										↓	
④	ヤーボイ 生理食塩液	1mg/kg 50mL	点滴静注	30分	↓																										↓	
⑤	生理食塩液	50mL	点滴静注	5分	↓														↓												↓	
CDDP+PEMは2コースで終了																																
⑥	デキサート アロカリス パロノセトロン	9.9mg 235mg 0.75mg/50mL	点滴静注	30分	↓														↓													
⑦	ペメトレキセド 生理食塩液	500mg/m <sup>2</sup> 100ml(全量)	点滴静注	10分	↓														↓													
⑧	硫酸Mg補正液 フィジオ70	8ml 500mL	点滴静注	60分	↓														↓													
⑨	マンニトール	300mL	点滴静注	60分	↓														↓													
⑩	シスプラチン 生理食塩液	75mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	60分	↓														↓													
⑪	フィジオ70	500mL	点滴静注	60分	↓														↓													

## ＜注意事項/備考＞

✓ 間質性肺炎：初期症状は息切れ、発熱、咳嗽(空咳)など、胸部X線検査やSpO2モニタリングなどで定期的なモニタリングを

✓ 血糖上昇：口渇、多飲、多尿、倦怠感などの症状に注意、来院時には血糖値の測定を

✓ 大腸炎・下痢：持続する腹痛、嘔吐、下痢、血便など

✓ 甲状腺機能障害：投与中は定期的にTSH、FT3、FT4などの検査を

✓ PEMの副作用軽減目的のために、葉酸とビタミンB12を併用

葉酸：初回投与7日以上前から1日1回0.5mgを連日経口投与（PEM中止/終了の場合は、最終投与から22日目まで継続）

ビタミンB12：初回投与少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与（投与期間中、投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与）

✓ Nivo、Ipi：0.2または0.22  $\mu$ mのインラインフィルターを用いて投与