

【日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン】

《無斷轉載禁止》

レジメン番号： NSC-216(BW<80kg)

対象疾患	レジメン名称	コース期間	総コース数	適応	催吐 リスク	根拠
非小細胞 肺がん (非扁平上皮)	Amivantamab+ CBDCA+PEM	21日間		<input checked="" type="checkbox"/> 進行/再発 <input type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> 放射線併用化学療法 <input type="checkbox"/> その他	高	N Engl J Med. 2023; 389: 2039-2051

＜注意事項/備考＞

- ✓ PEMの副作用軽減のために、葉酸とビタミンB12を併用
 - ✓ 葉酸：初回投与7日以上前から1日1回0.5mgを連日経口投与（PEM中止/終了の場合は、最終投与から22日目まで継続）
 - ✓ ビタミンB12：初回投与少なくとも7日前に、1回1mgを筋肉内投与（投与期間中、投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与）
 - ✓ ライブリバンドの投与量、投与速度はコース数、体重によって異なるため注意が必要
 - ✓ 皮膚障害Grade3→休薬 Grade2以下に回復するまで休薬
 - ✓