

癌化学療法輸液約束処方 膀胱3

癌種 膀胱癌
レジメン名 膀胱3 GEM + CDDP(変法)

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
ゲムシタビン	ゲムシタビン	GEM	600~1000 mg/m ²	div	DAY 1, 8, 15	1週	4週
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	70 mg/m ²	div	DAY 1	3週	4週

DAY 1(イメンドセット併用)

- ① アクチット 500 ml / 1.5時間
- ② フィジオ140 500 ml / 1.5時間
- ③ NS 50 ml + ファモチジン 1A + デカドロン 16mg全開
- ④ NS 100 ml + アロキシ 1A / 全開
- ⑤ NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分 時間厳守
- ⑥ NS 400 ml + シスプラチン mg / 2時間
- ⑦ アクチット 500 ml + フロセミド 1A + メクロプラミド 2A / 1.5時間 (別々のシリンジで)
- ⑧ フィジオ140 500 ml + メクロプラミド 2A / 1.5時間
- ⑨ フィジオ140 500 ml + メクロプラミド 1A / 1.5時間

DAY 8, 15

- ① NS 50 ml + デカドロン 8mg / 全開
- ② NS 100 ml + アロキシ 1A / 全開
- ③ NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分 時間厳守
- ④ アクチット 500 ml / 1.5時間

【備考】 DAY1のRp③開始時にイメンド125mg内服。