

癌化学療法輸液約束処方 第1

癌種

睾丸癌

レジメン名 第1

VIP (VP-16 + IFM + CDDP)

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
ベプシド	エトポシド	VP-16	75 mg/m ²	div	DAY 1-5	-	4週
イホマイド	イホスファミド	IFM	1200 mg/m ²	div	DAY 1-5	-	4週
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	20 mg/m ²	div	DAY 1-5	-	4週
ウロミテキサン	メスナ		240mg/m ² (イホマイドの20%量)	div	DAY 1-5	-	4週

<VIP療法前日>

メイン

- ① ビカネイト 1000 ml + アスパラK 1A + 10%NaCl 1A + フロセミド 1A / 12hr
- ② = ① do

<VIP療法 DAY 1-5>

メイン

- ① ビカネイト 1000 ml + 8.4%メイロン 40 ml + フロセミド 1/2A / 6.5hr
- ② アクチット 500 ml / 3.5hr
- ③ ヴィーンD 500 ml + ダイアモックス 500mg / 3.5hr
- ④ ソリタックスH 500 ml / 3.5hr
- ⑤ ビーフリード 500 ml / 3.5hr
- ⑥ ソリタックスH 500 ml / 3.5hr

側管

- 8:30 ① 生食 100 ml + アロキシ 1A(DAY1のみ) + デカドロン 16 mg / 30分 別々のシリンジで混注 ***イメンドカプセル内服**
- 9:00-10:00 ② 生食 250 ml + シスプラチン mg / 1hr
- 10:00-11:00 ③ 20%マンニトール 300 ml / 1hr
- 11:00-12:00 ④ 生食 250 ml + ベプシド mg / 1hr
- 12:00-14:00 ⑤ 5%ブドウ糖 500 ml + イホマイド mg / 2hr
- 12:00 ⑥ 生食 50 ml + ウロミテキサン mg / 30分
- 14:00 ⑦ 生食 100 ml + メトクロプラミド 2A / 30分
- 16:00 ⑧ 生食 50 ml + ウロミテキサン mg / 30分
- 20:00 ⑨ 生食 50 ml + ウロミテキサン mg / 30分
- 22:00 ⑩ 生食 50 ml + ファモチジン 1A / 30分

<VIP療法 DAY 6-7>

メイン

- ① ビカネイト 1000 ml + 8.4%メイロン 40 ml + フロセミド 1/2A / 6.5hr
- ② アクチット 500 ml / 3.5hr
- ③ ヴィーンD 500 ml + ダイアモックス 500mg / 3.5hr
- ④ ソリタックスH 500 ml / 3.5hr
- ⑤ ビーフリード 500 ml / 3.5hr
- ⑥ ソリタックスH 500 ml / 3.5hr

***PVCフリーラインでフィルター通さないこと**

<注意>

側管①投与時にイメンド内服 DAY1:125mg, DAY2-5:80mg

側管①のDAY2-5はアロキシなし

*ウロミテキサンはイホマイドの20%量を、イホマイド投与開始時、4時間後、8時間後に投与する。