

## 癌化学療法輸液約束処方 成人T細胞性白血病リンパ腫

再発・難治性のCCR4陽性末梢性T細胞リンパ腫、皮膚T細胞性リンパ腫

癌種 成人T細胞性白血病リンパ腫、再発・難治性のCCR4陽性末梢性T細胞リンパ腫・皮膚T細胞性リンパ腫

レジメン名 ATL1 ポテリジオ

薬品名(商品名)	一般名	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
ポテリジオ	モガムリズマブ	1mg/kg	div	DAY1,8,15,22,29,36,43,50	2時間	7日間

【DAY 1,8,15,22,29,36,43,50】

- ① NS 50ml + ポラミン 1A + ソルコーテフ 100mg / 30分 ☆別々のシリンジで混注
- ② NS 250ml + **ポテリジオ** mg / 2時間
- ③ NS 50ml / 全開

< 備考 >

- ① モニターを装着してバイタルチェック(開始前、開始後30分・60分・90分・120分)を行う。
- ② 全身症状を伴う重篤な皮膚障害(TEN、SJSなど)の発現に注意。投与中～投与終了後数週間以降にも発現することがある。
- ③ 皮疹、悪寒、戦りつ、SpO2<95%、BT≥38℃、その他異常を認めた際は一時中断し、主治医へ連絡。
- ④ infusion reaction を生じた際は、次回以降解熱鎮痛薬の内服やステロイドなど、前投薬を変更する。
- ⑤ 他の化学療法と併用する際は2週間1回の投与とする。

H30.3.6作成