

癌化学療法輸液約束処方 多発性骨髄腫:MM 5

癌種 再発・難治性多発性骨髄腫
レジメン名 MM 5 Kd

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1コース期間
デカドロン	デキサメタゾン	DEX	20mg/day	内服	DAY 1,2,8,9,15,16,22,23	28日間
カイプロリス	カルフィルゾミブ	KPL	20mg/m ² (1コース目のD1,2のみ) 56mg/m ² (1コース目のD8以降)	div	DAY 1,2,8,9,15,16	

- ① NS 250ml / 60分 ☆デカドロン20mg内服
- ② 5% Tz 50ml / 全開
- ③ 5% Tz 100ml + カイプロリス mg / 30分
- ④ 5% Tz 50ml / 全開
- ⑤ NS 250ml / 60分

<調整方法> 10mg/Vは 5ml、40mg/Vは20mlの注射水で溶解(2mg/ml)し、5%ブドウ糖液に希釈する。
本剤は 6.5%過量充填されているため、実充てん量は10.7mg, 42.6mg

- <備考>
- ① 本レジメンは、少なくとも1つの標準治療が無効または再発した患者が対象。
 - ② 投与量は1コース目のday1,2のみ20mg/m²,それ以降は56mg/m²。投与限界:体表面積2.2m²以上の患者は2.2m²で算出。
 - ③ Ccr 15ml/min 未満:本剤中止。透析時:20mg/m²以下の投与量を透析後に行う。
 - ④ Grade4の血液毒性、Grade3の非血液毒性発現時は休薬。
 - ⑤ 心障害:QT延長あり。定期的に心電図、電解質チェックすること。
 - ⑥ デカドロンによる有害事象(消化器毒性、浮腫、錯乱・気分変化、筋力低下、高血糖など)発現時は減量基準により減量。
(急性膵炎:デカドロンは永続的に中止)
 - ⑦ 減量基準:56mg/m²→45mg/m²→36mg/m²→27mg/m²→中止