

ANCA関連血管炎

レジメン名 腎内3 エンドキサンパルス療法 2w

| 薬品名(商品名) | 一般名 | 略号 | 標準投与量 | 投与日 | 投与時間 | 1クール期間 |
|----------|-----------|-----|---------------|------------|------|--------|
| エンドキサン | シクロホスファミド | CPA | 15 mg/kg | DAY1、15、29 | 180分 | 14日 |
| ウロミテキサン | メスナ | | CPAの40%量を3回/日 | DAY1、15、29 | 30分 | 14日 |

[DAY 1, 15, 29]

- ① NS 50 ml/ 5分
- ② NS 250 ml + エンドキサン mg / 180分【側管】④ NS 100 ml + ウロミテキサン mg / 30分(②投与開始と同時に)
- ③ NS 50 ml/ 5分
- ⑤ ヘパリンNaロックシリンジ(100単位)
- ⑥ NS 100 ml + ウロミテキサン mg / 30分(②投与開始から4時間後)
- ⑦ ヘパリンNaロックシリンジ(100単位)
- ⑧ NS 100 ml + ウロミテキサン mg / 30分(⑥投与開始から4時間後)
- ⑨ NS 50 ml/ 5分

【備考】

- ・ ウロミテキサンは、エンドキサン投与時、エンドキサン投与4時間後、エンドキサン投与8時間後に投与する。
- ・ 総コース数は最大10コースとする。
- ・ 休薬規定:WBC<1000/ μ L
- ・ 減量規定:年齢及び腎機能により投与量を調節(下記参照)

【投与量調節】

| 年齢 | 血清Cr(1.7~3.4 mg/dl) | 血清Cr(3.4~5.7 mg/dl) |
|----------|---------------------|---------------------|
| 60歳未満 | 15mg/kg/回 | 12.5mg/kg/回 |
| 60~70歳未満 | 12.5mg/kg/回 | 10mg/kg/回 |
| 70歳以上 | 10mg/kg/回 | 7.5mg/kg/回 |

R1.7.26作成