

## がん化学療法輸液約束処方 頭頸1

がん種:頭頸部癌

レジメン名:頭頸1 CDDP + RT

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1コースの期間
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	80 mg/m <sup>2</sup>	末梢静脈	DAY 1	20日間	21日間

### DAY 0: 化学療法前日

#### 【メイン】

- 9:00 ① ビカネイト 1000ml + アスパラカリウム 2キット / 12hr  
 21:00 ② ビカネイト 1000ml + アスパラカリウム 2キット / 12hr

### DAY 1

#### 【メイン】

- 9:00 ① ビカネイト 1000ml + ファモチジン 1V + メトクロプラミド 1A + アスパラカリウム 2キット / 12hr  
 21:00 ② ビカネイト 1000ml + ファモチジン 1V + メトクロプラミド 1A + アスパラカリウム 2キット / 12hr

#### 【側管】

- 9:00 ① NS 100ml + デキサート 2V + グラニセトロン 1A / 30min  
 9:30 ② NS 300ml + シスプラチン mg / 120min  
 11:30 ③ 20%マンニトール 300ml / 60min  
 12:30 ④ ソルデム3A 500ml / 180min  
 15:30 ⑤ NS 100ml + グラニセトロン 1A / 30min  
 16:00 ⑥ ソルデム3A 500ml / 240min

### DAY 2.3

#### 【メイン】

- 9:00 ① ビカネイト 1000ml + ファモチジン 1V + メトクロプラミド 1A + アスパラカリウム 2キット / 12hr  
 21:00 ② ビカネイト 1000ml + ファモチジン 1V + メトクロプラミド 1A + アスパラカリウム 2キット / 12hr

#### 【側管】

- 9:00 ① NS 100ml + デキサート 1V / 30min

- \* 備考 ① シスプラチンの希釈液は生理食塩水500mlから200ml抜いて使用する。  
 ② 対象患者の全身状態によりシスプラチンの投与時間および投与後の水分負荷量(投与時間含む)は変更可とする。

