

癌化学療法輸液約束処方 精胚4

癌種 精巣腫瘍（外来・入院）

レジメン名 精胚4 TGN

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	210 mg/m ²	div	DAY 1	21日間
ゲムシタビン	ゲムシタビン	GEM	1000 mg/m ²	div	DAY 1,8	
アクプラ	ネダプラチン	CDGP	100 mg/m ²	div	DAY 2	

[DAY 1]

- ① NS 50ml + デキサート 3V + ラニチジン 50mg / 30分
- ② NS 50ml + アロキシ 1A / 30分 ☆レスタミン錠50mg内服
- ③ NS 500ml + パクリタキセル mg / 180分
☆フィルター使用
- ④ NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ⑤ NS 50ml / 5分 フラッシュ

[DAY 8]

- ① NS 50ml + デキサート 1A / 30分
- ② NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ③ NS 50ml / 5分 フラッシュ

[備考]

- ① GEM; 投与時血管痛、皮疹の発現に注意。
- ② アロキシ開始時にレスタミン錠50mg内服する。

[DAY 2]

- ① NS 50ml + デキサート 1V / 30分
- ② NS 500ml + アクプラ mg / 60分
- ③ NS 50ml / 5分 フラッシュ

③ DEHPを含まない点滴セット、0.22ミクロン以下のインラインフィルター使用する。

④ ポリオキシエチレンヒマシ油のアレルギーに注意。

2020.10.28 改訂

