

癌化学療法輸液約束処方 急性リンパ性白血病

癌種 急性リンパ性白血病/バーキットリンパ腫、バーキットALL

HyperCVAD/HPMTX/AraC の髄注

レジメン名 MTX/AraC髄注

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	1クール期間
キロサイド	シタラビン	AraC	40 mg	one shot 髄注	HyperCVAD/HPMTX/AraC あたり1~2回	21~28日間
メトレキセート	メトレキセート	MTX	15 mg			
プレドニン	プレドニゾロン	PSL	10 mg			
生食		NS	1 ml			

MTX/AraC髄注

キロサイド	40 mg
メソテレキセート	15 mg
プレドニン	10 mg
生理食塩水	1 ml

髄注

《調製方法》

- ① キロサイド20mg(1ml)×2V:計2ml を5ccのシリンジに採取しMTXを溶解する。
- ② 2.5ccのシリンジに生食1ml を取り、プレドニンのバイアルに入れて溶解する。
- ③ ①のシリンジで②を吸い取り、全量3ml とする。
- ④ ロックキャップを付けて払い出す。

【備考】

- ① 髄注は、HyperCVAD/HPMTX/AraC 1コースあたり、1~2回。
- ② 総コースは、HyperCVAD/HPMTX/AraC は8回のため、髄注は16回まで。
- ③ 休薬規定: 骨髄抑制が強い場合

H28.6.30作成