

癌化学療法輸液約束処方 骨軟2

癌種 骨軟部肉腫

レジメン名 骨軟2 HD-IFM

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
イホマイド	イホスファミド	IFM	初回: 2 g/m ² 2回目以降: 0.33g/m ²	div	DAY 1-7	-	4週
ウロミテキサン	メスナ	-	初回: 2 g/m ² 2回目以降: 0.33g/m ² DAY 7 側管①②0.4g/m ²	div	DAY 1-7	-	4週

< 化学療法前日 >

- div ① ソルラクト 500 ml / 朝
 ② ソルデム3A 500 ml / 朝
 ③ ソルデム3A 500 ml / 夕
 ④ ソルデム3A 500 ml / 夕 残破棄可

< DAY 1 >

- div
 0:00 ① ソルラクト 500 ml / 180分
 3:00 ② 生食 100 ml + メトクロプラミド 2A / 30分
 3:30 ③ 生食 100 ml + デキサート 1A + グラニセトロン 1A / 30分
 4:00 ④ ソルデム3A 500 ml
 + イホマイド mg (2 g/m²)
 + ウロミテキサン mg (2 g/m²)
 + 8.4%メイロン 15 ml / 240分
 8:00 ⑤ ソルデム3A 500 ml
 + イホマイド mg (0.33 g/m²)
 + ウロミテキサン mg (0.33 g/m²)
 + 8.4%メイロン 15 ml / 240分
 12:00 ⑥ = ⑤
 16:00 ⑦ = ⑤
 20:00 ⑧ = ⑤

< DAY 2-6 >

- div
 0:00 ① ソルデム3A 500 ml
 + イホマイド mg (0.33 g/m²)
 + ウロミテキサン mg (0.33 g/m²)
 + 8.4%メイロン 15 ml / 240分
 4:00 ② = ①
 8:00 ③ = ①
 8:00 ④ 側管) 生食 100 ml + デキサート 1A + グラニセトロン 1A / 30分
 12:00 ⑤ = ①
 16:00 ⑥ = ①
 20:00 ⑦ = ①

< DAY 7 >

- div
 0:00 ① ソルデム3A 500 ml
 + イホマイド mg (0.33 g/m²)
 + ウロミテキサン mg (0.33 g/m²)
 + 8.4%メイロン 15 ml / 240分
 4:00 ② = ①
 8:00 ③ 生食 100 ml + デキサート 1A + グラニセトロン 1A / 30分
 8:30 ④ ソルデム3A 500 ml / 210分
 12:00 ⑤ ソルデム3A 500 ml / 240分
 16:00 ⑥ ソルデム3A 500 ml / 240分
 20:00 ⑦ ソルデム3A 500 ml / 240分
 側管
 13:00 ① 生食 20 ml + ウロミテキサン mg (0.4 g/m²) / 5分
 18:00 ② = ①

H26.10.31 改訂
 H30.3.6 改訂
 R4.4.25 改訂