

癌化学療法輸液約束処方 食9

癌種 食道癌（再発または遠隔転移を有する食道がん）

レジメン名 食9 weekly PTX

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	100 mg/m ²	div	D1,8,15,22,29,36	1週	49日

【DAY 1,8,15,22,29,36】経口可能時

- ① NS50ml+デキサート 1V / 5分
レスタミン5錠内服
- ② NS50ml+ファモチジン 1V / 5分
- ③ NS50ml+グラニセトロン 1A / 5分
- ④ NS250ml+ パクリタキセル mg / 60分
☆フィルター使用
- ④ NS50ml / 5分

【DAY 1,8,15,22,29,36】経口不能時

- ① NS50ml+デキサート 1V / 5分
- ② NS50ml+ファモチジン 1V / 5分
+ポララミン1A / 5分
- ③ NS50ml+グラニセトロン 1A / 5分
- ④ NS250ml+ パクリタキセル mg / 60分
☆フィルター使用
- ④ NS50ml / 5分

- 【備考】 ①グラニセトロンは主治医の判断で他のセロトニン拮抗薬に変更可。
②本レジメンは、少なくとも1レジメン以上の白金化合物を含む化学療法を受けた症例に対し、使用する。

