

癌化学療法輸液約束処方 食12

癌種 食道癌
 レジメン名 食12 DOC triw

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
ドセタキセル	ドセタキセル	DOC	70 mg/m ²	div	DAY1	2週	3週

div

- ① NS50ml+デキサート 2.5V / 5分
- ② 5%TZ250ml+ドセタキセル _____ mg / 60分 ☆フィルター使用
- ③ NS50ml / 5分

【備考】

浮腫予防目的: Day2からデカドロン錠8mg 分2 朝昼食後 3日間内服

【投与基準】

Cre ≤ 1.2 BUN ≤ 25mg/dl Ccr ≥ 60ml/min T-bili ≤ 1.5mg/dl AST,ALT ≤ ULN × 2.5

WBC ≥ 4000 かつ ≤ 10000 好中球 ≥ 2000 Hb ≥ 9.0 Plt ≥ 10 × 10⁴/m³

【減量基準】70 → 60mg/m²

Gr4の好中球減少が5日間以上、発熱を伴うGr3以上の好中球減少で抗菌薬を3日間以上

Gr3以上の血小板減少が5日以上、出血を伴うGr3以上の血小板減少で、輸血を要した時

悪心嘔吐、食欲不振、倦怠感、過敏症以外のGr3以上の非血液毒性