

癌化学療法約束処方 尿6

癌種 尿路移行上皮癌
登録No. 尿6 GP

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	175mg/m ²	div	Day 1	1週	21日間
ゲムシタビン	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ²	div	Day 1,8		

【DAY 1】

- ① NS 50ml + デキサート 3V + ファモチジン1A / 30分 ☆レスタミン50mg 点滴開始と同時に内服
- ② NS 500ml + パクリタキセル mg / 180分 ☆フィルター使用
- ③ NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ④ NS 50ml / 5分

【DAY 8】

- ① NS 50ml + デキサート1V / 30分
- ② NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ③ NS 50ml / 5分

【休薬規定】 【DAY 1】好中球<1500、血小板<10万、GOT/GPT>ULN×2.5、T-bli>ULN×1.5 Scr>ULN×1.5

【DAY 8】好中球<1000、血小板<7万

【減量規定】 血液毒性≥Grade3 非血液毒性≥Grade4→次コース50%Dose down
2週間以内に回復しない場合は治療中止

【備考】 PTX:ポリオキシエチレンヒマシ油によるアレルギーに注意
GEM:投与時の血管痛、皮疹に注意

2020.10.27 改訂