

癌化学療法約束処方 子体10

癌種 子宮体癌(平滑筋肉腫)
登録No. 子体10 GEM + DOC triw

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	1コースの期間
ゲムシタビン	塩酸ゲムシタビン	GEM	900 mg/m ²	30 分	末梢	DAY 1, 8	21日
ドセタキセル	ドセタキセル	DOC	75 mg/m ²	1 hr	末梢	DAY 8	

< DAY 1 >

- ① NS 50 ml + デキサート1V / 5分
- ② NS 50 ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ③ NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ④ NS 50 ml / 5分

< DAY 8 > フィルター使用

- ① NS 50 ml + デキサート1V / 5分
- ② NS 50 ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ③ NS 100 ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ④ NS 250 ml + ドセタキセル mg / 1hr
- ⑤ NS 50 ml / 5分

<減量規定> 好中球 ≤ 1000/mL, PL ≤ 10万/μL, Cre ≤ 2.0mg/dL, AST・ALT ≥ 2.5ULN, ALP ≥ ULN

【備考】発熱性好中球減少症に注意

子宮体癌治療ガイドラインに記載されているレジメン