

癌化学療法輸液約束処方 胆道 3

癌種 切除不能な進行胆道癌（外来・入院）

レジメン名 胆道3 Durvalmab+GC

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
イミフィンジ	デュルバルマブ	DUR	1500mg/body	div	60分	DAY 1	21日
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	25 mg/m ²			DAY 1, 8	
ゲムシタビン	ゲムシタビン塩酸塩	GEM	1000 mg/m ²		30分		

[DAY 1,8]

メイン

- ① NS 50ml / 5分【DAY1のみ】
- ② NS 100ml + イミフィンジ 1500 mg / 60分 ☆フィルター使用【DAY1のみ】
- ③ NS 500ml / 60分
- ④ NS 500ml / 60分
- ⑤ NS 500ml / 60分

[備考]

総クール制限: 8クールまで

休薬基準: Gr2以上の血液毒性、非血液毒性

その他の休薬基準は呼42参照

減量基準: 体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kg

側管

- ③ NS 100ml + デキサート 1V / 30分
- ③ NS 100ml + アロキシ 1V / 30分(デキサート投与後)
- ④ NS 250ml + シスプラチン mg / 60分
- ⑤ NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ⑤ NS 100ml + フロセミド 0.5A / 30分(ゲムシタビン投与後)

R5.1.14作成