

## 癌化学療法輸液約束処方 胃8

癌種 胃癌

レジメン名 胃8 TS-1 / CPT-11 biweekly

| 薬品名(商品名) | 一般名             | 略号     | 標準投与量                  | 投与経路 | 投薬期間     | 休薬期間 | 1クール期間 |
|----------|-----------------|--------|------------------------|------|----------|------|--------|
| ティーエスワン  | テガフルギメラシルオテラシルK | S1     | 80~120mg/body          | po   | 3週       | 1~2週 | 4~5週   |
| イリノテカン   | イリノテカン          | CPT-11 | 60~80mg/m <sup>2</sup> | div  | DAY1, 15 | -    | 4~5週   |

※実施決定後より内服開始

div

- ① NS50ml+デキサート 1V / 5分
- ② NS50ml+アロキシ1V / 5分
- ③ 5%TZ500ml+ イリノテカン mg / 90分
- ④ NS50ml / 5分

<備考> TS-1投与量

| BSA                             | 1日投与量 |
|---------------------------------|-------|
| BSA < 1.25m <sup>2</sup>        | 80mg  |
| 1.25 < BSA < 1.50m <sup>2</sup> | 100mg |
| 1.50m <sup>2</sup> ≥ BSA        | 120mg |

<注意> 化学療法当日 ①アルカリ水服用(ボルビック)

- ②腸管アルカリ化 炭酸水素ナトリウム1.5g  
ウルソサン(50) 3T / 3×D1T

H21.7.1改訂

R5.9.11改訂