

癌化学療法輸液約束処方 胃29

癌種 大腸癌 再発・切除不能（通院外来用） インフューザーポンプ使用

レジメン名 胃29 NIVO+FOLFOX

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与時間	投与経路	投与日	投与期間
オプジーボ	ニボルマブ	NIVO	240mg/body	30分	DIV	DAY1	2週間
レボホリナート	レボホリナートCa	I-LV	200mg/m ²	2時間	DIV	DAY1	
エルプラット	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	2時間	CVポート	DAY1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	5分	CVポート	DAY1	
フルオロウラシル	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	46時間	CVポート	DAY1~2	

【CVポート】

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + オプジーボ 240 mg / 30分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ 5%TZ 50ml + デキサート1V / 5分
- ⑤ 5%TZ 50ml + グラニセトロン 1A / 5分
- ⑥ 5%TZ 250ml + エルプラット mg / 120分（同時divあり）
- ⑦ 5%TZ 50ml + フルオロウラシル © mg / 5分

⑧ フルオロウラシル mg
NS ml 計 ml / 46hr ニプロ シュアーフューザー使用

終了時NS20mlでフラッシュ

SFS-1002D (100ml用)

SFS-5-25 (250ml用)

【末梢】

⑥と同時

⌈ 5%TZ 250ml + レボホリナート ④ mg / 120分

└ 5%TZ 50ml / 5分

R4.1.20作成