

# 癌化学療法輸液約束処方 絨毛③

癌種 絨毛癌（入院）  
レジメン名 絨3 MEA

薬品名（商品名）	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
メトトレキサート	メトトレキサート	MTX	150 mg/body	iv	-	DAY 1	21日間
			300 mg/body	div	4 hr		
ベプシド	エトポシド	VP-16	100 mg/body	div	1 hr	DAY 1,2,3,4,5	
コスメゲン	アクチノマイシンD	ACT-D	0.5 mg/body	iv	-	DAY 1,2,3,4,5	

**[ DAY 1 ] \*PVCフリーライン、フィルターなし**

- 8:30-9:00 ① NS 100ml + アロキシ 0.75mg + ファモチジン 20mg + デキサート2V / 30分 **\*イメンドカプセルセット併用**
- 9:00-9:30 ② NS 100ml + ダイアモックス 250mg / 30分
- 9:30 ③ NS 10ml + **メトトレキサート 150mg** / 静脈内注射
- 9:30-13:30 ④ 5%TZ 500ml + **メトトレキサート 300mg** / 4時間
- 13:30-14:30 ⑤ 5%TZ 500ml + **エトポシド 100mg** / 1時間
- 14:30 ⑥ 注射用水 2ml + **コスメゲン 0.5mg** / 静脈内注射
- 14:30-18:30 ⑦ ビカネイト 1000ml + 8.4%メイロン 80ml + ネオファーゲン 40ml / 4時間
- 18:30-19:00 ⑧ NS 100ml + メトクロプラミド 20mg + ダイアモックス 250mg + ファモチジン 20mg / 30分 total 10時間30分

**[ DAY 2 ] \*PVCフリーライン、フィルターなし**

- ① NS 100ml + ファモチジン 20mg + デキサート2V / 30分
- ② NS 100ml + ダイアモックス 250mg / 30分
- ③ ロイコボリン 15mg / 筋肉内注射(MTX投与24時間後)
- ④ 5%TZ 500ml + **エトポシド 100mg** / 1時間
- ⑤ 注射用水 2ml + **コスメゲン 0.5mg** / 静脈内注射
- ⑥ ビカネイト 1000ml + 8.4%メイロン 80ml + ネオファーゲン 40ml / 4時間
- ⑦ NS 100ml + メトクロプラミド 20mg + ダイアモックス 250mg + ファモチジン 20mg / 30分
- ⑧ ロイコボリン 15mg / 筋肉内注射(MTX投与36時間後) total 6時間30分

**[ DAY 3 ]** DAY 2 の①～⑦ do ③ロイコボリンはMTX投与48時間後 total 6時間30分

**[ DAY 4-5 ]** DAY 2 の①、②と④～⑦ do total 6時間30分

**[ DAY 6-7 ]**

- ① NS 100ml + デキサート1V / 30分
- ② ソルデム3A 500ml + メトクロプラミド 10mg / 2時間
- ③ ソルデム3A 500ml + メトクロプラミド 10mg / 2時間 total 4時間30分

**[ DAY 1-7 ]**

- ① ドンペリドン(10) 3T 分3 毎食後 7日分 H26.10.31 改訂