

## 癌化学療法輸液約束処方 呼 42

癌種 切除不能非小細胞肺癌 (Stage III)  
 レジメン名 呼42 DUL

薬品名 (商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与時間	投与日	1クール期間
イミフィンジ	デュルバルマブ	DUL	10 mg/kg	div	60分	DAY 1	14日

### [ DAY 1 ]

- ① NS 50ml / 15分
- ② NS 100ml + イミフィンジ          mg / 60分 (インラインフィルター使用)
- ③ NS 50ml / 15分 フラッシュ可

### 【注意事項】

- ・化学放射線後、維持療法として使用 12カ月間まで
- ・投与の際にはインラインフィルターを使用すること。
- ・投与開始前及び投与中にTSH、FT3、FT4などを定期的に測定。
- ・有害事象に対し副腎皮質ステロイドを投与する際に、HBVの再活性化に注意。

### <休薬規定>

- ・非血液毒性  $\geq$  Grade2
  - ・間質性肺炎: G2→休薬、 $\geq$  G3→投与中止
- ・自己免疫疾患の発症
  - ・大腸炎、下痢: G2/3→休薬 (G1→再開)、G4→投与中止
  - ・肝機能障害: G2→休薬 (ベースラインまで改善→再開)、 $\geq$  G3→投与中止
  - ・内分泌障害、副腎クリーゼ: 投与延期または中止
  - ・神経毒性: G2→投与延期 (ベースラインに改善→再開)、 $\geq$  G3→投与中止
  - ・皮膚毒性:  $\geq$  G3→休薬 (G1→再開)、 $\geq$  G2→皮膚科医へ紹介
  - ・1型糖尿病、脳炎、静脈血栓症: 専門医と連携し投与中止も検討