

癌化学療法輸液約束処方 非ホジキンリンパ腫

癌種 CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫

レジメン名 NHL2 R-CHOP CHOPのみ

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投与日	投与時間	1クール期間
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	750mg/m ²	div	DAY1	1.5時間	21-28日
ドキシソルビシン	塩酸ドキシソルビシン	ADR	50mg/m ²	div	DAY1	15分	
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.4mg/m ² (MAX2mg/body)	div	DAY1	15分	
プレドニン	プレドニゾロン	PSL	100mg/body	po	DAY1-5	-	

CHOP

【DAY 1】

- ③ NS 50ml + グラニセトロン 1A / 15分
- ④ NS 50ml + ドキシソルビシン mg / 15分
- ⑤ NS 50ml + オンコビン mg / 15分
- ⑥ NS 250ml + エンドキサン mg / 1.5時間
- ⑦ NS 50ml / 全開

< 備考 >

- ① ドキシソルビシン: 累積投与量依存的に心筋障害の発生頻度上昇。総投与量500mg/m²。
- ② ドキシソルビシン: 壊死性抗がん剤であるため、血管外漏出に注意。
- ③ エンドキサン調製時は ファシール使用のこと。

H27.4.17 作成
H27.10.1 改訂