

癌化学療法輸液約束処方 乳29

癌種 乳癌
登録No. 乳29 HP+wPTX

薬品名(商品名)	一般名	略号	標準投与量	投与経路	投薬期間	休薬期間	1クール期間
パージェタ	ペルツズマブ	PER	初回840mg,2回目以降420mg	div	DAY1	2週	3週
トラスツズマブ	トラスツズマブ	HER	初回8mg/kg,2回目以降6mg/kg	div	DAY1	2週	3週
パクリタキセル	パクリタキセル	PTX	80mg/m ²	div	DAY1.8.15		3週

【DAY1】

- ① NS 50ml / 5分 初回カロナール併用
- ② NS 250ml+ パージェタ mg / 初回60分 2回目以降30分
- ③ NS 50ml / 5分
- ④ NS 250ml(2回目以降100ml)+ トラスツズマブ mg / 初回60分 2回目以降30分
- ⑤ NS 50ml / 5分
- ⑥ NS 100ml+デキサート 1V+ファモチジン1V+ポララミン1A+グラニセトロン 1A / 10分
- ⑦ 5%G250ml+ パクリタキセル mg /60分 ☆フィルターあり
- ⑧ NS50ml / 5分

【DAY8.15】

- ① NS 100ml+デキサート 1V+ファモチジン1V+ポララミン1A+グラニセトロン 1A/10分
- ② 5%G250ml+ パクリタキセル mg /60分 ☆フィルターあり
- ③ NS50ml / 5分

- 【注意事項】 1.フィルター(0.22μm)を使用すること
2.初回施行時カロナール錠併用(400mg以上が望ましい)

【休薬基準】 好中球数<1000 非血液毒性≥Grade3

