

癌化学療法輸液約束処方 乳30

癌種 乳癌
レジメン名 乳30 PEMBRO+GC

制吐薬要注意

| 薬品名(商品名) | 一般名 | 略号 | 標準投与量 | 投与経路 | 投与日 | 1クール期間 |
|----------|----------|--------|------------------------|------|---------|--------|
| キイトルーダ | ペムブロリズマブ | PEMBRO | 200 mg/body | div | DAY 1 | 21日間 |
| ゲムシタビン | 塩酸ゲムシタビン | GEM | 1000 mg/m ² | div | DAY 1、8 | |
| カルボプラチン | カルボプラチン | CBDCA | AUC 2 | div | DAY 1、8 | |

[DAY 1]

- ① NS 50ml / 5分
- ② NS 100ml + キイトルーダ 200 mg / 30分 ☆フィルター使用
- ③ NS 100ml / 10分
- ④ NS 100ml + デキサート 1V + アロキシ1V / 30分
- ⑤ NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ⑥ NS 100ml / 30分
- ⑦ NS 250ml + カルボプラチン mg / 30分
- ⑧ NS 50ml / 30分

[DAY 8]

- ① NS 100ml + デキサート 1V + アロキシ1V / 30分
- ② NS 100ml + ゲムシタビン mg / 30分
- ③ NS 100ml / 30分
- ④ NS 250ml + カルボプラチン mg / 30分
- ⑤ NS 50ml / 30分

[備考]

呼38参照

[減量・休薬規定]

PEMBRO:呼38参照

CBDCA/GEM:休薬Grade3以上の血液毒性、非血液毒性

減量Grade4以上の血液毒性

トリプルネガティブ乳癌に対して適応

R4.10.27 作成